


Kartoffeln: Strategie gegen Kraut- und Knollenfäule




* auf Flächen mit Metalaxyl-Resistenz keine Anwendung von Metalaxyl-haltigen Produkten

Alternaria:

**+ Signum 0,25 kg/ha max. 4 Spritzungen

- Bei latent infizierten Kartoffeln muss die erste Spritzung mit einem systemischen Produkt erfolgen
- Ein Wirkstoffwechsel muss in der Spritzfolge zur Vorbeugung von Resistenzen vorgenommen werden.

Maximale Zahl der Anwendungen: - 8 x Shirlan
- 6 x Ranman
- 6 x Dithane NeoTec



Strategie gegen Kraut- und Knollenfäule - Unterfolienanbau -

Spritzstart bei
Folienabnahme

bei stärkstem
Krautzuwachs

in der Mitte der
Spritzfolge

Abschluss-
spritzung

hoch


<p>Acrobat Plus 2,0 kg/ha + Ranman 0,2 l/ha +FHS</p>	<p>Infinito 1,5 l/ha</p>	<p>Ranos Dual 0,6 kg/ha + 0,2 l/ha + FHS</p>	<p>Ranman 0,2 l/ha + FHS</p>
<p>Infinito 1,5 l/ha</p>	<p>Valbon 1,6 kg/ha</p>	<p>Ranman 0,2 l/ha + FHS</p>	<p>Ranman 0,2 l/ha + FHS</p>

Infektionsgefahr

gering

Maximale Zahl der Anwendungen: - 8 x Shirilan
- 6 x Ranman

wegen Metalaxyl- Resistenz
in Frühkartoffelgebieten keine
Anwendung von Metalaxyl-
haltigen Produkten



Kartoffeln: Kraut- und Knollenfäule Stoppspritzung

Eine Stoppspritzung sollte bei ersten sichtbarem Krautfäulebefall auf der Fläche durchgeführt werden. Grundsätzlich wird bei der Stoppspritzung zweimal innerhalb von 3 Tagen behandelt, d.h. nach der Vorlage wird die 2. Spritzung spätestens nach 3 Tagen appliziert.

1.Tag: **Ranos Dual** (Tanos 0,7 kg/ha + Ranman 0,2 l/ha + FHS)

4.Tag: **Infinito 1,5 l/ha + Shirlan 0,4 l/ha**

oder

1.Tag: **Ranos Dual** (Tanos 0,7 kg/ha + Ranman 0,2 l/ha + FHS)

4.Tag: **Revus 0,6 kg/ha + Shirlan 0,4 l/ha**

