

Alcide UDDERgold[®] PM vet



ANWENDUNGSBEREICH

Als Tierarzneimittel zugelassenes (Zulassungs-Nr. 401140.00.00) Zitzentauchmittel zur Mastitisprophylaxe bei Rindern nach dem Melken.

EIGENSCHAFTEN

Alcide UDDERgold[®] PM vet ist ein Zweikomponentenpräparat (Aktivator und Basis) mit hervorragender Desinfektionsleistung gegen Mastitiserreger auf der Zitzenhaut. Hochwertige Pflegekomponenten und ein besonderer Säureschutzmantel machen die Zitzenhaut geschmeidig und widerstandsfähig. Alcide UDDERgold[®] PM vet unterstützt die Mastitisprophylaxe gegen bakterielle Erreger wie Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis oder Escherichia coli. Die Gelformulierung bildet bis zum nächsten Melken eine schützende Barriere auf der Zitzenspitze.

HERSTELLUNG DER GEBRAUCHSLÖSUNG

Alcide UDDERgold[®] PM vet - Basis stets nur in Kombination mit Alcide UDDERgold[®] PM vet - Aktivator anwenden!

1. Gleiche Mengen Basis und Aktivator in einen sauberen Dippbecher geben und mischen bis die Farbe einheitlich goldgelb ist.
2. Jede Zitze vollständig in die fertige Gebrauchslösung tauchen und mindestens 15-30 sec. einwirken lassen.
3. An der Luft trocknen lassen. Nicht abwischen!

ANWENDUNGSHINWEISE

Sobald die Lösung verschmutzt ist, oder ihre gelbe Farbe verliert, sollte die Lösung entsorgt werden und der Dippbecher mit frischer Lösung gefüllt werden.

Die goldgelbe Farbe des gemischten Produkts kann mit der Zeit verblassen; dieser Vorgang kann durch höhere Temperaturen beschleunigt werden. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Das zubereitete Tierarzneimittel innerhalb von 14 h verwenden.

GEGENANZEIGEN

Nicht bei entzündeten oder verletzten Zitzen anwenden. Bei der Anwendung an verletzten Zitzen ist mit einer Verzögerung der Wundheilung zu rechnen. Es wird deshalb empfohlen, die Behandlung bis zur Abheilung auszusetzen.

Bei Auftreten von Irritationen der Zitzenhaut, Anwendung stoppen und erst nach Genesung fortsetzen.

Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Tierarzt.

Nicht zur Reinigung von Melkgeräten verwenden

NEBENWIRKUNGEN

Allergische Reaktionen sind möglich. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Alcide UDDERgold[®] PM vet

WARTEZEIT

Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

BESONDERE HINWEISE

Gebrauchte Lösung niemals in das Originalgebinde zurückgeben. Kopf des Dippbechers bei Verschmutzung und nach jedem Melken mit Wasser ausspülen.

Die Zitzen vor dem nächsten Melken gründlich mit einem geeigneten Euterreinigungsmittel waschen und anschließend trocknen.

Produkt nur äußerlich anwenden!

CHEMISCHER AUFBAU

Konzentrat Aktivator: pH 2,0-3,0

Milchsäure 26,4mg/ml; Natriumbenzoat (E211); Tartrazin (E102)

Konzentrat Basis: pH 11,0-11,5

Natriumchlorit 6,4mg/ml (entspr. 4,84mg/ml chlorige Säure); Natriumedetat

SICHERHEIT

Alcide UDDERgold[®] PM vet (Basis) nur mit **Alcide UDDERgold[®] PM vet (Aktivator)** mischen - niemals mit anderen Produkten mischen!

Nach Gebrauch Hände waschen. Auf ausreichende Belüftung achten, da reizende Chlordioxidgase freigesetzt werden können. Augenreizend. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer Reizung einen Arzt hinzuziehen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt das Tierarzneimittel durch Verdünnen entfernen, d. h.: bei äußerlichem Kontakt: mit Wasser spülen; bei Verschlucken: Wasser trinken; bei Einatmen: an die frische Luft gehen.

Nach dem Dippen Kühe bis zum Abtrocknen der Zitzen (ca. 8-20 Minuten) vor Frost oder Zugluft in der kalten Jahreszeit schützen.

Für detaillierte Hinweise bitte die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

LAGERUNG

Für Kinder und Unbefugte unzugänglich lagern

- Basis und Aktivator nur im Originalbehälter dicht geschlossen, aufrecht stehend aufbewahren.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten
- Produkt aus anderen Behältern (Dippbecher) nicht in Originalgebinde zurückfüllen.
- Kühl und vor Lichteinfluss geschützt lagern

Alcide UDDERgold[®] PM vet

LAGERUNG

- Lager und Transporttemperatur: 0-25° C
- Nicht einfrieren (Einfrieren hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Tierarzneimittels, sofern der gefrorene Inhalt **vor** dem Mischen von Basis und Aktivator vollständig aufgetaut ist und gut durchmischt wird).

HALTBARKEIT

Die Komponenten Aktivator und Basis sind dicht verschlossen bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar.

Die Gebrauchslösung (Aktivator + Basis) ist innerhalb von 14h zu verbrauchen.

ENTSORGUNG

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel (Konzentrate) sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Tierarzneimittel (Konzentrate) dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalsation entsorgt werden.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben der bei uns zu den Konzentraten Basis und Aktivator erhältlichen Sicherheitsdatenblätter.

GEBINDE

Aktivator: 20 L

Basis: 20 L

- Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich.
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder und Unbefugte aufbewahren.
- Weder die Einzelkomponenten, noch die Vormischung aus den Komponenten Aktivator und Basis mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. Desinfektions- oder Reinigungsmittel) mischen.

Alcide UDDERgold[®] PM vet – Basis und Aktivator sind ausschließlich für den gewerblich-industriellen Bereich bestimmt. Die Angaben dieses Merkblattes stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen und deren ordnungsgemäße Lagerung. Sie sind keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verwendung unserer Produkte befreien sie den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen, entsprechenden Vorsichts- und allgemeinen Sicherheitsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität, jedoch keine Erfolgsgarantie, da die Anwendung von vielen Faktoren abhängig ist. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. (November 2010)